

NOMBRE DEL PRODUCTO

ECOALGA ACTIVADOR VEGETATIVO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Extracto de algas líquido. Producto a base de extracto de algas marinas (Ulva spp). Rico en magnesio, alginatos y β -carotenos.

ECOALGA es un producto qué, por su composición y características, activa los enzimas vegetales, provocando un crecimiento más rápido, una mejor nutrición y una mayor producción. Favorece la asimilación de otros nutrientes y potencia la tolerancia a bajas temperaturas y situaciones de estrés. Estimula la brotación y adelanta la cosecha. Ayuda a la conservación de los frutos cosechados. Hace que la planta sea más resistente al ataque de enfermedades. Confiere a la planta un color verde más intenso. Por su alto contenido en magnesio es ideal para el metabolismo energético de los cultivos, como elemento estimulante principal de la molécula de clorofila y responsable de la fotosíntesis.

A modo de síntesis:

- ✓ Estimula el crecimiento de las raíces, la precocidad y el crecimiento vegetativo
- ✓ Favorece el intercambio entre la raíz y el suelo
- ✓ Ayuda a la recuperación de los cultivos que sufren un estrés
- ✓ Incrementa el poder de absorción radicular y translocación de los nutrientes
- ✓ Mejora el sistema radicular
- ✓ Mejora el trasplante
- ✓ Favorece la floración y el cuajado
- ✓ Potencia la resistencia natural de los cultivos
- ✓ Aumenta el número de frutos y el calibre y mejora su calidad
- ✓ Reduce la absorción de sodio por parte de la planta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes



FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN

Materia orgánica 1,33% p/v; Magnesio (MgO) soluble en agua 0,34% p/v; Potasio (K₂O) soluble en agua 0,234% p/v; Fósforo (P₂O₅) soluble en agua 0,08% p/v; Ácido alginico 0,89% p/v; Aminoácidos totales 1,667% p/v; β-carotenos 1,234 mg/kg.


Secuencia de aminoácidos.

• 4-hidroxiprolina.....	0,0266%	• Leucina.....	0,1423%
• Ac. Aspártico + Asparragina.....	0,208%	• Lisina	0,0623%
• Ac. Glutámico + Glutamina.....	0,134%	• Metionina.....	0,0323%
• Alanina.....	0,120%	• Prolina.....	0,1316%
• Arginina.....	0,0584%	• Serina.....	0,1096%
• Fenilamina.....	0,0923%	• Tirosina.....	0,0767%
• Glicina.....	0,1687%	• Treonina.....	0,0827%
• Histidina.....	0,0157%	• Valina	0,1383%
• Isoleucina.....	0,059%		

PRESENTACIÓN

CATEGORÍA	FORMATO
Nutrientes	1 litro
	5 litros
	10 litros
	20 litros

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes



FICHA TÉCNICA



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	APLICACIONES	DOSIS FOLIAR	DOSIS VÍA RADICULAR
Cítricos, Aguacate, Olivo, Vid, Frutales en general	Realizar 3 aplicaciones durante la brotación, cuajado y engorde de los frutos.	300 cc/100 l	4 l/ha
Fresa, Frambuesa, Arándano y Mora, Berries en general	Realizar aplicaciones cada 10 - 14 días durante el trasplante, brotación, cuajado y engorde de los frutos.	250 cc/100 l	3 l/ha
Tomate, Pimiento, Pepino, Melón, Sandía, Berenjena, Judía y Hortalizas en general	Realizar 3-4 aplicaciones durante la plantación, inicio de la floración, engorde de frutos y maduración	200 cc/100 l	3 l/ha
Acelga, Lechuga, col, Coliflor, Apio y otras hortalizas de consumo de hojas	Realizar 3-4 aplicaciones durante el cultivo. Comenzar cuando las plantas tienen 4-6 hojas. Repetir cada 14 días.	250-300 cc/100 l	3 l/ha
Maíz, Arroz y Cereales en general	Realizar 3-4 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo cada 10-12 días	250-350 cc/100	2,5 - 3,5 l/ha
Viveros	Realizar aplicaciones durante el desarrollo cada 10-12 días.	200-250 cc/100 l	3 l/ha
Ornamentales	Aplicar cada 15-21 días	200 - 250 cc/100 l	3 l/ha

PLAZO DE SEGURIDAD Y LMRS

No procede

MODO DE EMPLEO

Por su composición y características, activa los enzimas vegetales, provocando un crecimiento más rápido, una mejor nutrición y una mayor producción.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes



► FICHA TÉCNICA



Por su contenido en magnesio y β -carotenos es idóneo para promover el metabolismo celular y como cosmético de la piel para dar colores intensos a los frutos. Aplíquese mediante pulverización foliar. Se recomienda la utilización de agua suficiente para obtener un buen recubrimiento del cultivo. Es un excelente vehículo para la aplicación de fitohormonas o productos de baja dosis tanto en aplicación foliar como vía riego por goteo. Tiene un gran sinergismo con reguladores de crecimiento, auxinas, citoquininas y giberelinas. Si no se tiene experiencia con el regulador o la fitohormona, realice una prueba previa. En cultivos de cereales (arroz, maíz, trigo, cebada y avena) se recomienda no superar la dosis total de 15 l/ha y año; en los demás cultivos no superar la dosis de 20 l/ha y año. En cítricos, aplicar como muy tarde a finales de junio en variedades de recolección otoñal e invernal. Varias aplicaciones a dosis bajas dan mejores resultados que una aplicación a dosis excesiva.

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios.

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños
- ✓ No comer, beber ni fumar durante su utilización
- ✓ pH 5,6
- ✓ Conductividad eléctrica 8,29 dS/m

GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por [SIGFITO](#), o entréguelo a un gestor autorizado.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

